

## Anafilaxia - Plan de acción para emergencias

Nombre del paciente: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Alergias: \_\_\_\_\_

Asma ☐ Sí (*alto riesgo de reacción grave*) ☐ No

Problemas adicionales de salud, además de anafilaxia: \_\_\_\_\_

Medicamentos concurrentes: \_\_\_\_\_

	Síntomas de anafilaxia
BOCA	picazón, hinchazón de labios y/o lengua
GARGANTA*	picazón, opresión/cierre, ronquera
PIEL	picazón, ronchas, enrojecimiento, hinchazón
INTESTINOS	vómitos, diarrea, calambres
PULMÓN*	disnea, tos, sibilancia
CORAZÓN*	pulso débil, mareos, desmayos

*Puede ocurrir que se presenten solo algunos síntomas. La gravedad de los síntomas puede cambiar rápidamente.  
\*Algunos síntomas pueden poner la vida en peligro. ¡ACTÚE CON RAPIDEZ!*

### 1. Pasos que se deben seguir en caso de emergencia - ¡NO DUDE EN ADMINISTRAR EPINEFRINA!

Injecte epinefrina en el muslo usando (marque uno): ☐ Adrenaclick (0.15 mg) ☐ Adrenaclick (0.3 mg)

☐ Auvi-Q (0.15 mg) ☐ Auvi-Q (0.3 mg)

☐ EpiPen Jr (0.15 mg) ☐ EpiPen (0.3 mg)

Epinefrina via inyeccion, USP auto-inyector- generico autorizado

☐ (0.15 mg) ☐ (0.3 mg)

☐ Otros (0.15 mg) ☐ Otros (0.3 mg)

Especifique otros (incluyendo epinefrina nasal): \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE: EN CASO DE ANAFILAXIA, NO SE PUEDE DEPENDER DE LOS INHALADORES CONTRA EL ASMA Y/O LOS ANTIHISTAMÍNICOS.**

### 2. Llame al 911 o a la patrulla de rescate (antes de llamar a los contactos)

3. Contacto de emergencia #1: casa \_\_\_\_\_ hogar \_\_\_\_\_ celular \_\_\_\_\_

Contacto de emergencia #2: casa \_\_\_\_\_ hogar \_\_\_\_\_ celular \_\_\_\_\_

Contacto de emergencia #3: casa \_\_\_\_\_ hogar \_\_\_\_\_ celular \_\_\_\_\_

Comentarios: \_\_\_\_\_

Firma del médico / Fecha / Número de teléfono

Firma de los padres (para menores de 18 años) / Fecha